

# Harnasmeervallen

Categorie: Bijvissen

Datum website publicatie: 19-3-2016

Datum laatste update: 17-2-2025

## Kenmerken

Typisch aan de harnasmeervallen zijn de beenachtige platen die het hele lijf bedekken. De vissen bezitten een zuigmond op de lippen en hebben een relatief lang spijsverteringskanaal. Wat vrij ongewoon is voor beenachtige vissen is dat ze een iris bezitten die de vorm heeft van een omega.



<https://www.youtube.com/watch?v=laC85kajlUg>

## Verspreiding

De harnasmeervallen komen voor in Costa Rica, Panama en Zuid-Amerika en behoren allemaal tot de zoetwatervissen. Als exoot worden ze ook aangetroffen in Zuid- en Centraal-Florida waar ze voor de eerste keer werden gerapporteerd in 1995.

## Taxonomie

Deze grootste meervalfamilie omvat ongeveer 800 soorten in ruim 90 geslachten en zes onder families. Volgens Nelson[1] worden de volgende geslachten onderscheiden:

Rijk: Animalia (Dieren)

Stam: Chordata (Chordadieren)

Klasse: Actinopterygii (Straalvinnigen)

Orde: Siluriformes (Meervalachtigen)

Familie: Harnasmeervallen (Loricariidae)

Onderfamilie: Zie tabel

Ancistrinae	Hypoptopomatinae	Hypostominae	Lithogeneinae	Neoplecostominae	Loricariinae
<b>Acanthicus</b>	Acestridium	Corymbophanes	Lithogenes	Neoplecostomus	Apistoloricaria
<b>Ancistrus</b>	Corumbataia	Delturus		Pareiorhaphis	Aposturisoma
<b>Baryancistrus</b>	Epactionotus	Glyptoperichthys		Pareiorhina	Brochiloricaria
<b>Chaetostoma</b>	Eurycheilichthys	Hemiancistrus		Upsilon	Crossoloricaria
<b>Cordylancistrus</b>	Hisonotus	Hemipsilichthys			Cteniloricaria
<b>Dekeyeseria</b>	Hypoptopoma	Hypostomus			Dasylicaria
<b>Dolichancistrus</b>	Microlepidogaster	Isbrueckerichthys			Dentectus
<b>Exastilithoxus</b>	Nannoptopoma	Kronichthys			Farlowella
<b>Guyanancistrus</b>	Niobichthys	Pogonopoma			Furcodontichthys
<b>Hopliancistrus</b>	Otocinclus	Pseudorinelepis			Harttia
<b>Hypancistrus</b>	Otothyris	Pterygoplichthys			Harttiella
<b>Lasiancistrus</b>	Otothyropsis	Rhinelepis			Hemiloricaria
<b>Leporacanthicus</b>	Oxyropsis	Squaliforma			Hemiodontichthys
<b>Leptoancistrus</b>	Parotocinclus				Ixinandria
<b>Lipopterichthys</b>	Pseudotocinclus				Lamontichthys
<b>Lithoxancistrus</b>	Pseudotothyris				Limatulichthys
<b>Lithoxus</b>	Schizolecis				Loricaria
<b>Megalancistrus</b>					Loricariichthys
<b>Neblichthys</b>					Metaloricaria
<b>Oligancistrus</b>					Paraloricaria
<b>Panaqolus</b>					Planiloricaria
<b>Panaque</b>					Pseudohemiodon
<b>Parancistrus</b>					Pseudoloricaria
<b>Peckolt</b>					Pterosturisoma
<b>Pseudacanthicus</b>					Pyxiloricaria
<b>Pseudancistrus</b>					Reganella
<b>Pseudolithoxus</b>					Rhadinoloricaria
<b>Spectracanthicus</b>					Ricola
					Rineloricaria
					Spatuloricaria
					Sturisoma
					Sturisomatichthys

1. *Systematiek met doorlopende familie familienummers en ordenummers volgens Fishes of the World (4th edition) van Joseph S. Nelson 2006*  
 ISBN: 978-0-471-25031-9

Bron: <http://nl.wikipedia.org/wiki/Harnasmeervallen>